



TRITTICO®

► Trazodone

À quoi sert ce médicament ?

- TRITTICO® est indiqué chez l'adulte dans les troubles dépressifs avec ou sans anxiété.

Médicament disponible dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.

Comprimés filmés sécables de **50 mg** ou **100 mg** (boîte de 30 comprimés)
Forme retard : comprimés filmés sécables de 150 mg (boîte de 60 comprimés)



► Ce médicament doit être conservé entre 15 et 25°C.



► **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien.

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	Plusieurs prises par jour à prendre après les repas, à heures fixes ou 1 prise par jour le soir au coucher.
Comment ?	Dose initiale : 75 à 150 mg/j Poursuite de traitement : augmentation possible jusqu'à 300 mg/j A prendre de manière fractionnée ou en prise unique le soir au coucher. Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau. Les comprimés sont sécables.
Adaptation posologique ?	Certaines situations cliniques peuvent nécessiter des adaptations posologiques : respectez les recommandations de votre médecin.

► Que faire en cas d'oubli ?

- **En cas d'oubli** : sauter la dose oubliée et administrer votre prochaine dose à l'heure habituelle.
Ne doublez pas la dose pour compenser une dose oubliée.

► Que faire en cas de vomissements ?

- **Après la prise du médicament** : ne pas reprendre la dose.
Ne doublez pas la dose pour compenser.

Mise en garde et précaution d'emploi



Des interactions avec d'autres médicaments peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.




Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.



- **Grossesse** : administration du traitement déconseillé durant la grossesse sauf s'il est indispensable
- **Allaitement** : Trittico ne devrait pas être pris pendant l'allaitement. Si un traitement s'avère nécessaire, il conviendra de stopper l'allaitement.

Quels effets indésirables peuvent survenir avec TRITTICO® ?

Comme tous les médicaments, TRITTICO® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables les plus fréquents	Prévention/surveillance
 Sécheresse de la bouche	Buvez beaucoup d'eau.
 Somnolence	Attention à la conduite automobile.
 Douleurs dans les membres, douleurs dorsales, myalgie, arthralgie	Contactez votre médecin si vous ressentez un ou plusieurs de ces effets indésirables.



Seuls certains effets indésirables sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :

