



Propranolol 10mg/5ml solution buvable 150 ml

A quoi sert ce médicament ?

Indications : hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, cardiomyopathies, troubles du rythme, tétralogie de Fallot, syndrome du QT long congénital, syndrome de Marfan, hyperthyroïdie néonatale, tachycardie supra ventriculaire, chez les patients qui ne peuvent pas avaler les comprimés.

Présentation : flacon de 150 mL, l'administration de ce médicament nécessite un adaptateur flacon et une seringue (non inclus dans le conditionnement)

Médicament sous autorisation d'accès compassionnel disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance



► Conservation : 3 mois après ouverture à température ambiante < à 25°C (attention aux fortes chaleurs), ne pas conserver au réfrigérateur



► Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien



► Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation du médicament

Conseils de prise

Quand et comment ?

..... mg soit ml, toutes les heures

L'administration doit se faire à heure fixe, **de préférence pendant ou après un repas pour limiter les risques d'hypoglycémies**

Ne jamais arrêter brutalement le médicament sans l'avis d'un médecin



► En cas d'oubli d'une dose, la dose suivante doit être prise à l'heure habituelle, ne pas doubler la dose

► En cas de vomissement : ne pas prendre de nouvelle dose, poursuivre le traitement à l'heure habituelle sans la doubler

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation







Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables. Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.

- Ne pas boire d'alcool pendant la prise de Propranolol.
- Informez votre médecin si vous allez subir une opération ou une anesthésie.



- Ne pas utiliser pendant la grossesse.
- Utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.
- Interrompez l'allaitement durant le traitement.

Quels effets indésirables peuvent survenir avec Propranolol buvable ?

Effets indésirables les plus fréquents		Prévention
	Bradycardie hypotension Essoufflement vertiges	Fatigue, étourdissement, essoufflement peuvent être les signes d'une bradycardie. Tête qui tourne, points noirs ou étoiles devant les yeux, faiblesse, chutes peuvent être les signes d'une hypotension orthostatique. Consultez votre médecin si ces symptômes persistent
	Troubles du sommeil, fatigue, diminution de la résistance à l'effort	Privilégiez une alimentation saine et à horaires réguliers. Limitez l'usage de psychostimulants tels que café, tabac et alcool. Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité même modérée ; couchez vous à heure régulière. Soyez prudent en cas de conduite automobile. En cas de vertiges, reposez-vous au calme et décomposez vos mouvements, évitez de vous lever trop brusquement.
	Diarrhée, nausées, vomissements	En cas de nausées, fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. En cas de diarrhée, utilisez les médicaments antidiarrhéiques qui vous ont été prescrits et pensez à bien vous hydrater. En cas de vomissements, utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits.
	Sensation de froid aux extrémités	Protéger vous du froid, plonger les doigts dans l'eau tiède en les bougeant ou en les massant



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien



Pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Contacts utiles :

Fiche remise le :

