



# Perchlorate de sodium

IRENAT®Tropfen, solution buvable en gouttes 300 mg/ml

## A quoi sert ce médicament ?

### Indications :

- Hyperthyroïdie par surcharge iodée à l'amiodarone ou au produit de contraste iodé :
  - En association avec les antithyroïdiens de synthèse (ATS)
  - En monothérapie dans les hyperthyroïdies non contrôlées par les ATS ou en cas d'intolérance aux ATS
- Hypothyroïdie induite par surcharge iodée à l'amiodarone dans le cas où la lévothyroxine risque d'entraîner ou entraîne une aggravation de la pathologie cardiaque
- Protection thyroïdienne lors de certains examens scintigraphiques
- Détection des troubles de l'organification de l'iode par la glande thyroïde

### Présentation :

- Solution buvable en gouttes 300 mg/ml (1ml=21 gouttes) , flacon de 20mL avec compte gouttes, solution claire, incolore et inodore
- **Sous autorisation d'accès compassionnelle**

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance



► Conservation : à conserver 12 semaines après ouverture, dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière



► Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

## Conseils de prise :

<b>Quand ?</b>	..... gouttes ou ..... mL, ..... fois par jour pendant ..... jour en respectant la prescription médicale
<b>Comment ?</b>	Diluer les gouttes dans un grand verre d'eau pour éviter les irritations locales À prendre après le repas pour diminuer les effets indésirables gastro-intestinaux Plusieurs doses réparties au cours de la journée car durée d'action limitée



- En cas d'oubli d'une dose, la dose suivante doit être prise à l'heure habituelle, ne pas doubler la dose
- En cas de vomissement : ne pas prendre de nouvelle dose, poursuivre le traitement à l'heure habituelle sans la doubler

## Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation :









Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.



- ▶ Ne pas utiliser pendant la grossesse.
- ▶ Interrompez l'allaitement durant le traitement.

## Quels effets indésirables peuvent survenir avec IRENAT® ?

Effets indésirables	Conduite à tenir
 Agranulocytose (réversible à l'arrêt)	Pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin
 Crampes musculaires, sensation de brûlure dans les pieds	Un exercice régulier (marche 3 fois par semaine) et des exercices de relaxation peuvent réduire la douleur. Anticipez tout risque de chute et utilisez rampes, barres d'appui et canne au besoin. Ayez une alimentation saine et équilibrée
 Nausées, vomissements, diarrhée, sécheresse de la bouche, irritation pharyngée	En cas de diarrhée, privilégiez une alimentation pauvre en fibres, évitez certains aliments qui peuvent augmenter le transit intestinal. En cas de nausées/vomissements, fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés. En cas de vomissements, utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits. En cas de sécheresse de la bouche, buvez beaucoup d'eau.
 Eruption cutanée, purpura, démangeaison, acné, chute de cheveux	Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon et évitez l'eau chaude. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Evitez les expositions au soleil.
 Syndrome néphrotique réversible	Contactez votre médecin
 Douleurs articulaires avec fièvre, hypothyroïdie, réactions allergiques	Contactez votre médecin



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Pensez à faire pratiquer les examens biologiques sanguins prescrits par votre médecin

## Que faire en cas de survenue d'effets indésirables ?

- ▶ Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv.fr](http://signalement-sante-gouv.fr)

**Contactez rapidement votre médecin** en cas de :

- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



**Contacts utiles :**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fiche remise le :**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_