



FABHALTA® gélule

► Iptacopan

À quoi sert ce médicament ?

- Iptacopan FABHALTA® est un indiqué pour traiter l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (une maladie entraînant la présence d'hémoglobine dans les urines) et une maladie touchant les reins (glomérulopathie à dépôts de C3)
- Prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en hématologie ou médecine interne ou néphrologie
- Médicament disponible en pharmacie hospitalière (rétrocession) sur présentation de votre ordonnance et du numéro de référence communiqué par votre médecin

Gélule jaune pâle avec les inscriptions « LNP200 » sur le corps de la gélule et « NVR » sur la tête de la gélule



► Conservation à température ne dépassant pas 25°C, hors de la vue et de la portée des enfants



► **Lavez-vous** soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules



► **Ne jetez pas** les boîtes entamées, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	h..... eth.....	= 2 prises par jour à heure fixe pendant ou en dehors d'un repas
Comment ?	Avez les gélules entières, avec de l'eau, chaque jour au même moment de la journée. Ne pas ouvrir, ni mâcher, ni couper.	

L'arrêt ou l'interruption du traitement peut entraîner un risque de destruction des globules rouges (hémolyse)



- **En cas d'oubli**, prenez une dose dès que possible même si c'est peu de temps avant la dose suivante prévue. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.
- N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.
- Anticipez vos consultations médicales et la commande de votre traitement

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation

Des interactions avec d'autres médicaments peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables

Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.



- **Grossesse** : demandez conseils à votre médecin
- **Allaitement** : demandez conseils à votre médecin



Quels effets indésirables peuvent survenir avec FABHALTA® ?

Comme tous les médicaments, FABHALTA® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
 Risque d'infection	Une vaccination est nécessaire au moins 2 semaines avant de débuter le traitement. Des rappels de vaccination et/ou des antibiotiques pourront également être nécessaire afin de réduire le risque d'infection. Limitez les contacts avec les personnes ayant une infection. Lavez-vous régulièrement les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Contactez votre médecin en cas de température > 38°C, toux, essoufflement/respiration douloureuse, douleur lors des mictions/urines odorantes, changement de la nature/fréquence des selles (diarrhée, constipation), ou en cas de rougeur, douleur ou suintement autour du cathéter central, de la sonde d'alimentation parentérale ou de la sonde urinaire.
 Maux de tête	Pensez à bien vous hydrater. Mangez à heure régulière, ne sautez pas de repas. Evitez tabac et alcool (déclencheurs de maux de tête). Evitez les couchers tardifs, les grasses matinées ; dormez suffisamment la nuit.
 Douleurs articulaires	Pratiquez une activité physique régulière et adaptée (marche, natation). Aidez-vous d'une canne pour soulager les articulations. Evitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants.
 Effets digestifs : diarrhée, nausées, douleurs abdominales	Surveillez votre poids et pensez à bien vous hydrater (1,5 à 2L d'eau/jour). En cas de diarrhée , privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...). Evitez certains aliments qui peuvent stimuler le transit intestinal (laitages, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices). En cas de nausées/vomissements , fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Buvez plutôt entre les repas.

 Seuls certains effets indésirables sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

- ▶ Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)
- ▶ Portez votre carte sur vous en permanence pendant le traitement et montrez-la à tout professionnel de santé impliqué dans votre parcours de soin

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Signes d'infection (fièvre, toux, frissons, brûlures urinaires...)
- Courbatures accompagnées de symptômes pseudo-grippaux
- Maux de tête, sensation de malaise, raideur au niveau de la nuque
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :

