

# Accident d'exposition aux virus (AEV) en pédiatrie

## 1/ Indication de traitement post exposition (TPE) ?



= URGENCE < 4H - max 48 H

Risque < 48H et nature de l'exposition	HSH* ou personne trans ou UDI* ou originaire pays haute endémie*	Contexte agression sexuelle	Autre situation avec partenaire statut VIH inconnu	Statut VIH connu et charge virale détectable
Rapport anal	TPE recommandé	TPE recommandé	TPE recommandé	TPE recommandé
Rapport vaginal	TPE recommandé	TPE recommandé	TPE recommandé **	TPE recommandé
Rapport orogénital seul	pas de TPE	TPE recommandé	pas de TPE	TPE si CV > 1000 copies/ml

\*HSH = homme ayant des rapports sexuels avec les hommes , UDI = utilisateur de drogues injectables, pays de haute endémie (Afrique sub-saharienne, Thaïlande, Guyane)

\*\* hors recommandations nationales - sera réévalué en consultation < J7

## 2/ si TPE recommandé =



- > **DELSTRIGO®** si enfant > 12 ans et > 35 kg
- > **BIKTARVY® formulation adulte** si enfant > 25 kg et/ou difficultés à avaler
- > **BIKTARVY® formulation pédiatrique** si enfant < 25 kg



## 3/ prélèvement bilan bio initial :

- > sérologie VIH, VHB, VHC, syphilis
  - > PCR chlamydiae/gonocoque x 3 sites si possible
    - > +/- β-HCG
    - > + créatinémie + ALAT si TPE
- le bilan bio ne doit pas retarder la prise du TPE



Réévaluation en consultation sous 7 jours