


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



TRACLEER® peut rendre inefficace une contraception hormonale (pilule, implant). Il est impératif d'utiliser une autre méthode de contraception (stérilet, préservatif) pendant le traitement et pendant 3 mois après.

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :

.....
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :

.....
.....
.....

Tél :

.....
.....

Bosentan

TRACLEER®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un **traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire**. Il améliore la circulation sanguine pulmonaire. Il est également indiqué dans la **sclérodémie systémique**.

Il est prescrit par un **médecin hospitalier, spécialiste en cardiologie ou pneumologie ou médecine interne, ou dermatologie ou rhumatologie**.

Il est **disponible uniquement** dans les **pharmacies hospitalières**

Il existe 3 dosages :

- 32 mg : boîte de 56 comprimés (1 plaquettes de 56 comprimés jaunes pâles)
- 62,5 mg : boîte de 56 comprimés (4 plaquettes de 14 comprimés blancs orangés)
- 125 mg : boîte de 56 comprimés (4 plaquettes de 14 comprimés blancs orangés)

A conserver à **température ambiante** ne dépassant pas 30°C



Version de janvier 2019
Validée par experts régionaux

Posologie Conseils de prise

Bosentan
TRACLEER®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



Posologie :

1 comprimé 2 fois par jour (matin et soir) de 62,5 mg puis 1 comprimé 2 fois par jour (matin et soir) de 125 mg.

A prendre avant, pendant ou après les repas.

En cas d'oubli:

En cas d'oubli de la prise du matin:

Vous pouvez prendre le comprimé oublié jusqu'à midi puis poursuivre votre traitement de façon habituelle sans décaler ou doubler la prise suivante.

En cas d'oubli de la prise du soir:

Prenez le comprimé oublié dès que possible dans la soirée, sans décaler ou doubler la prise du lendemain



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin.

Quelques conseils



Prendre ce médicament aux **mêmes heures chaque jour** vous aidera à ne pas oublier votre traitement.



Le comprimé doit être avalé avec un verre d'eau.



Si vous avez pris plus de TRACLEER® que vous n'auriez dû, consultez immédiatement votre médecin ou pharmacien.



Conservez hors de portée des enfants.



Ne pas utiliser pendant une grossesse. Des tests de grossesse seront à réaliser tous les mois.
L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

	Maux de tête	PARACETAMOL efficace dans la plupart des cas <u>A noter:</u> évitez les comprimés effervescents si vous êtes soumis à un régime pauvre en sel (teneur élevée en sel) Si les douleurs sont trop importantes, parlez-en à votre médecin
	Rougeurs de la face	Cet effet est normal. Vous pouvez l'atténuer en utilisant une base de maquillage verte
	Gonflement des jambes et des chevilles	Parlez-en à votre médecin.
	Perturbation du bilan biologique (anémie, perturbations au niveau du foie)	Il est important de réaliser les prises de sang prescrites par votre médecin et de lui rapporter les résultats à chaque RDV.
	Vertiges/hypotension	Evitez de vous lever trop brusquement.
	Diarrhées, reflux, nausées Inconfort digestif	Mangez lentement. Evitez les repas trop riches et trop copieux.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;