


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Informez votre médecin en cas de traitement anti-infectieux en cours

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :

.....
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :

.....
.....
.....

Tél :

.....
.....

Sélexipag UPTRAVI®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un **traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Il améliore la circulation sanguine pulmonaire.**

Il est prescrit par un **médecin hospitalier, spécialiste en cardiologie ou pneumologie ou médecine interne.**

Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières.**

Ce médicament se présente sous le forme de comprimés de **couleurs différentes** suivant le **dosage**:

- 200 µg: boîte de 60 ou 140 comprimés ronds jaune pâle
- 400 µg: boîte de 60 comprimés ronds rouges
- 600 µg: boîte de 60 comprimés ronds violet clair
- 800 µg: boîte de 60 comprimés ronds verts
- 1000 µg: boîte de 60 comprimés ronds orange
- 1200 µg: boîte de 60 comprimés ronds violet foncé
- 1400 µg: boîte de 60 comprimés ronds jaune foncé
- 1600 µg: boîte de 60 comprimés ronds marron

Conservation à température ambiante

Posologie Conseils de prise

Sélexipag
UPTRAVI®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



Posologie :

La dose initiale est généralement de 200 µg 2 fois par jour. Cette dose peut être ensuite augmentée chaque semaine par pallier progressif de 200 µg 2 fois par jour jusqu'à une posologie entre 200 µg et 1600 µg.

.....

.....

.....

En cas d'oubli:

Si vous oubliez une dose, prenez le(s) comprimé(s) dès que vous vous en rendez compte, puis continuez à prendre vos comprimés à l'heure habituelle.

Si vous vous en apercevez moins de 6 heures avant l'horaire de la prise suivante, alors, ne prenez pas le(s) comprimé(s) oublié(s) et continuez à prendre vos comprimés à l'horaire habituel.

Ne doubler pas une prise pour compenser une prise oubliée.

Si le traitement n'a pas été pris pendant 3 jours ou plus, contacter immédiatement votre pneumologue.



N'arrêtez jamais le traitement ou de modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin.

Quelques conseils



Les comprimés doivent être avalés entiers avec un verre d'eau



Ne mâchez pas, n'écrasez pas ou ne cassez pas les comprimés.



A l'initiation du traitement et à chaque augmentation de dose : il est recommandé de prendre le traitement le soir.



En cas d'interruption de traitement, informez votre médecin. Le traitement devra être réintroduit à plus petite dose.



En cas d'arrêt, il faudra interrompre le traitement progressivement






Utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement. L'allaitement est déconseillé.



Ne le laissez pas à la portée des enfants.

**Ces réactions sont plus fréquentes pendant la période initiale d'adaptation de la posologie. Elles sont habituellement transitoires.*

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;

 	Maux de tête*	PARACETAMOL efficace dans la plupart des cas <u>A noter:</u> évitez les effervescents si vous êtes soumis à un régime pauvre en sel (teneur élevée en sel) Si les douleurs sont trop importantes, parlez-en à votre médecin
 	Diarrhées, nausées, vomissements*	Évitez les repas trop gras, à odeur forte. Fractionnez les repas. Mangez lentement. Si les nausées persistent, parlez-en à votre médecin pour la mise en place d'un traitement.
	Rougeurs du visage* (Bouffées vasomotrices)	Éviter les aliments épicés et l'alcool. Essayer de vous rafraîchir. Vous pouvez l'atténuer en utilisant une base de maquillage verte
	Douleurs de la mâchoire* et des extrémités*, myalgies*, arthralgies*.	Si les douleurs sont trop importantes, parlez-en à votre médecin.
	Rhinite*	Lavage du nez au sérum physiologique
	Réaction de photosensibilité (réaction cutanée suite à une exposition au soleil)	Appliquer une crème solaire d'indice élevé lorsque vous vous exposez au soleil