

# Selexipag

UPTRAVI®

FICHE  
CONSEIL

Professionnel

## Conditions de prescription et de délivrance

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier, spécialiste en cardiologie ou pneumologie ou médecine interne. Uniquement disponible en pharmacies hospitalières.

## Présentation et caractéristiques

Boîtes de 60 comprimés pelliculés. 8 dosages différents : 200µg (cp jaune pâle), 400µg (cp rouge), 600µg (cp violet clair), 800µg (cp vert), 1000µg (cp orange), 1200µg (cp violet foncé), 1400µg (cp jaune foncé), 1600µg (cp marron).

*Pour la phase d'adaptation posologique, il existe également une boîte de 140 comprimés à 200µg*

Conservation à température ambiante

## Indications

Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) en classe fonctionnelle OMS II-III :

- en association chez les patients insuffisamment contrôlés par une monothérapie ou une bithérapie par un antagoniste des récepteurs de l'endothéline (ARE) et/ou un inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5 (IPDE-5)
- en monothérapie chez les patients qui ne peuvent pas être traités par ces médicaments.

*L'indication ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie, est uniquement: le traitement de l'HTAP OMS III en trithérapie (en association avec: ARE + IPDE-5)*

## Précautions d'emploi

- Patients ayant des facteurs de risque d'hypotension
- Risque d'hyperthyroïdie
- En cas d'apparition d'oedème pulmonaire: interrompre le traitement

## Mécanisme d'action

Promédicament, métabolisé dans l'organisme par les carboxylestérases en un métabolite actif, 37 fois plus puissant. Le sélexipag et son métabolite actif sont des agonistes sélectifs et de haute affinité du récepteur de la prostacycline. Ils induisent ainsi une vasodilatation ainsi qu'un effet antiprolifératif et antifibrotique.

## Posologie et mode d'administration

- Dose initiale est généralement de 200 µg 2 fois par jour. Cette dose peut être ensuite augmentée chaque semaine par palier progressif de 200 µg 2 fois par jour jusqu'à une posologie entre 200 µg et 1600 µg. Objectif: déterminer la dose maximale tolérée
- Insuffisance Hépatique (IH): aucun ajustement de dose en cas d'IH légère ; dose initiale de 200µgx1/jour et adaptation par palier de 200µgx1/jour en cas d'IH modérée ; ne pas donner en cas d'IH sévère.
- Insuffisance Rénale (IR): pas d'ajustement de posologie

## Contre-indications (autres que médicamenteuses) :

- Hypersensibilité au médicament
- Coronaropathie sévère ou angor instable
- Infarctus du myocarde < 6 mois
- Insuffisance cardiaque décompensée non contrôlée médicalement
- Arythmie sévère
- Troubles vasculaires cérébraux (AVC, AIT) < 3 mois
- Anomalies valvulaires congénitales ou acquises avec retentissement cardiaque cliniquement significatif

## Interactions médicamenteuses

Contre-indiqué avec le gemfibrozil  
(inhibiteur puissant du CYP 2C8)

Inhibiteurs/inducteurs du CYP2C8

**Rappeler au patient de donner la liste complète de ses médicaments à tout médecin, même ceux vendus sans ordonnance, ainsi que ceux à base de plantes.**

## Principaux effets indésirables et conduite à tenir

Maux de tête*	<b>PARACETAMOL efficace dans la plupart des cas</b> <u>A noter:</u> évitez les comprimés effervescents si vous êtes soumis à un régime pauvre en sel (teneur élevée en sel) Si les douleurs sont trop importantes, parlez-en à votre médecin
Diarrhées, nausées, vomissements*	Évitez les repas trop gras, à odeur forte. Fractionnez les repas. Mangez lentement. Si les nausées persistent, parlez-en à votre médecin pour la mise en place d'un traitement.
Rougeurs du visage* (Bouffées vasomotrices)	Éviter les aliments épicés et l'alcool. Essayez de vous rafraîchir. Vous pouvez l'atténuer en utilisant une base de maquillage verte
Douleurs de la mâchoire* et des extrémités*, myalgies*, arthralgies*.	Si les douleurs sont trop importantes, parlez-en à votre médecin.
Rhinite*	Lavage du nez au sérum physiologique
Réaction de photosensibilité (réaction cutanée suite à une exposition au soleil)	Appliquer une crème solaire d'indice élevé lorsque vous vous exposez au soleil

\*Réactions plus fréquentes pendant la période initiale d'adaptation de la posologie. Habituellement transitoires.

## Conseils à donner aux patients



Les comprimés doivent être avalés entiers avec un verre d'eau



Ne mâchez pas, n'écrasez pas ou ne cassez pas les comprimés.



A l'initiation du traitement et à chaque augmentation de dose : il est recommandé de prendre le traitement le soir.



En cas d'interruption de traitement, informez votre médecin. Le traitement devra être réintroduit à plus petite dose.



En cas d'arrêt, il faudra interrompre le traitement progressivement

Si vous oubliez une dose, prenez le(s) comprimé(s) dès que vous vous en rendez compte, puis continuez à prendre vos comprimés à l'heure habituelle.



**Si vous vous en apercevez moins de 6 heures avant l'horaire de la prise suivante, alors, ne prenez pas le(s) comprimé(s) oublié(s) et continuez à prendre vos comprimés à l'horaire habituel.**

**Ne doubler pas une prise pour compenser une prise oubliée.**

## Grossesse et allaitement

Utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement.  
L'allaitement est déconseillé.

