

Salbutamol

VENTOLIN®

Conditions de prescription et de délivrance

Médicament sous ATU nominative avec PUT

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, prescription hospitalière réservée aux spécialistes en neurologie et pédiatrie

Présentation et caractéristiques

Sympathomimétique, bêta-2-mimétique

Présentation :

- Comprimés de 2mg (boîte de 100 cpr)

Excipients : Lactose monohydraté, amidon de maïs, amidon pré-gélatinisé, stéarate de magnésium.

- Sirop 2mg/5mL (flacon de 150mL)

Excipients : Saccharine sodique, acide citrique monohydraté, citrate de sodium dihydraté, hypromellose, benzoate de sodium, chlorure de sodium, arôme orange, eau purifiée.

Caractéristiques :

- Comprimés : conservation à T° ambiante < 25°C
- Sirop : conservation à T° ambiante < 30°C
- Sirop : péremption 1 mois après ouverture

Indications

- Syndrome myasthénique congénital ne répondant pas ou répondant insuffisamment aux traitements par anti-cholinestérasiques ou aggravés par ceux-ci
- Amyotrophie musculaire spinale (types I, II et III)

Posologie et mode d'administration

| | |
|---|--|
| <u>Chez l'adulte et l'enfant > 6 ans</u> | ▶ 2 mg (1 cpr ou 5mL de sirop) 3 ou 4 fois par jour |
| <u>Chez l'enfant de 2 à 6 ans</u> | ▶ 1 à 2 mg (2,5 à 5 mL de sirop) 3 ou 4 fois par jour |

- ▶ En cas d'oubli d'une dose, prendre la dose suivante au moment habituel (pas de double dose).

Interactions médicamenteuses

- Halothane
- Béta-bloquants non sélectifs
- Antidiabétiques
- Corticoïdes

Principaux effets indésirables

- Tremblements, céphalées
- Tachycardie, palpitations
- Crampes musculaires
- Hypokaliémie, hyperglycémie (rares)


Contre-indications


- Hypersensibilité au principe actif ou aux excipients
- Liées aux effets cardio-vasculaires du sulfate de salbutamol :
 - cardiopathie sévère, antécédents de cardiopathie ischémique
 - thyrotoxicose
 - hypertension artérielle sévère ou non contrôlée
 - éclampsie, pré-éclampsie


Précautions d'emploi


- Hyperthyroïdie
- Affection cardiovasculaire
- Diabète
- Traitement concomitant hypokaliémiant
- Grossesse, allaitement
- Avant d'instaurer le traitement puis tous les 6 mois, il est indispensable de réaliser :
 - un bilan biologique sanguin incluant ionogramme, NFS, TSH, glycémie, créatinine, kaliémie, test de grossesse
 - une mesure de la pression artérielle
 - un ECG et une échographie cardiaque (au moins 1 fois/an).

Conseils à donner aux patients

 Informer le patient de contacter son médecin en cas d'apparition d'effet indésirable grave.

 Rappeler au patient de signaler son traitement par Ventolin® à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, ...).

 Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin. Rappeler au patient de ne jamais prendre l'initiative seul.

 Rappeler au patient de ne pas prendre un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

