

Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté

VAXIGRIP HS®

Conditions de prescription et de délivrance

Médicament sous ATU nominative

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction de prescripteurs

Présentation et caractéristiques

Vaccin anti-grippal.

Les souches contenues dans Vaxigrip HS® (hémisphère sud) sont les mêmes souches que celles contenues dans Vaxigrip® (hémisphère nord), avec une saison d'avance.

Présentation :

- Seringue pré-remplie de 0,5 mL, avec aiguille attachée (antigènes du virus de la grippe, inactivé, fragmenté, cultivé sur œufs embryonnés de poules provenant d'élevages sains).

Excipients : Solution tampon (NaCl, KCl, phosphate disodique dihydraté, phosphate monopotassique, eau ppi).

Traces possibles : œufs (comme l'ovalbumine), néomycine, formaldéhyde, octoxinol-9.

Caractéristiques :

- Conservation entre 2°C et 8°C, à l'abri de la lumière

Indications

- Prévention de la grippe chez les personnes immuno-déprimées ou avec terrain à risque (asthme,...) voyageant dans les pays de l'hémisphère sud pendant la période d'épidémie de grippe.

Posologie et mode d'administration

<u>Adulte</u>	▶ 1 injection de 0,5 mL
<u>Enfant</u>	▶ A partir de l'âge de 36 mois : 0,5 mL ▶ De 6 à 35 mois : 0,25 mL Chez les enfants < 9 ans jamais vaccinés : une 2e dose devra être injectée après un intervalle de 4 semaines min.

- ▶ Administrer par voie IM ou SC profonde.

Interactions médicamenteuses

- Autres vaccins : Vaxigrip HS® peut être administré en même temps que d'autres vaccins mais pratiquer les injections sur 2 membres différents.
- Traitements immunosuppresseurs (réponse immunitaire diminuée)

Principaux effets indésirables

- Toute population : Céphalées, myalgies, arthralgies, douleurs / sensibilité / prurit / ecchymoses au point d'injection, augmentation de la transpiration, fièvre, frissons.
- Pour les enfants de moins de 36 mois : Diarrhées, vomissements, somnolence.


Contre-indications


- Hypersensibilité aux substances actives, à l'un des excipients ou à tout constituant pouvant être présent à l'état de traces comme les œufs (ovalbumine, protéines de poulet), la néomycine, le formaldéhyde et l'octoxinol-9.
- Maladie fébrile modérée ou sévère, ou maladie aiguë : différer la vaccination
- Administration par voie intravasculaire


Précautions d'emploi

- Réaction anaphylactique suite à l'administration du vaccin (rare) : surveillance.
- Thrombocytopénie ou troubles de la coagulation

Conseils à donner aux patients

 Informer le patient de contacter son médecin en cas d'apparition d'effet indésirable grave.

 Rappeler au patient de signaler son injection de Vaxigrip HS® à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, ...).

 Rappeler au patient de ne pas prendre un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

