

Apixaban

ELIQUIS®

FICHE
CONSEIL
Professionnel

Présentation et caractéristiques

ELIQUIS® est un **anticoagulant oral**, inhibiteurs sélectif du facteur Xa. Cet **AOD-** anticoagulant oral direct est une alternative aux AVK-antivitamines K qui sont des anticoagulants plus anciens. Eliquis® empêche la formation de caillots.

Dosages disponibles	Présentation
Eliquis® 2,5 mg	Comprimé pelliculé de couleur jaune. Boîte de 10, 20 ou 60
Eliquis® 5 mg	Comprimé pelliculé de couleur rose. Boîte de 60

- Pas d'antidote spécifique en cas de surdosage
- Pas de contrôle biologique en routine : posologie fixe. Un dosage est possible au cas par cas dans un centre spécialisé

Indications

Comprimé à 2,5 mg :

- **Prévention des événements thromboemboliques veineux (ETEVE) chez les patients adultes ayant bénéficié d'une chirurgie programmée pour prothèse totale de hanche PTH ou de genou PTG.**

Comprimé à 2,5 mg et à 5 mg :

- **Prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC) et de l'embolie systémique chez les patients adultes atteints de fibrillation atriale non valvulaire (FANV) et présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque tels que :** antécédent d'AVC ou d'accident ischémique transitoire (AIT) ; âge ≥ 75 ans ; hypertension artérielle ; diabète ; insuffisance cardiaque symptomatique (classe NYHA \geq II).
- **Traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l'embolie pulmonaire (EP), et prévention de la récurrence de TVP et d'EP chez l'adulte**

Indications	Posologie
Prévention de l'accident vasculaire cérébrale et de l'embolie systémique chez les patients adultes avec fibrillation atriale non valvulaire FANV	10 mg/j soit 1 comprimé à 5 mg <u>2 fois/jour</u> 5 mg/j soit 1 comprimé à 2.5 mg <u>2 fois/jour</u> si : association d'au moins 2 des critères suivants : <ul style="list-style-type: none">- Patient ≥ 80 ans- Poids ≤ 60 kg- créatinine sérique $\geq 1,5$ mg/dL
Prévention des ETEVE post-chirurgies programmées pour PTH ou PTG	5 mg/j soit 1 comprimé à 2.5 mg <u>2 fois/jour</u> Le traitement sera instauré 12 à 24 heures après l'intervention. <i>Durée de traitement : PTH \rightarrow 32 à 38 jours</i> <i>PTG \rightarrow 10 à 14 jours</i>
Traitement de la TVP et de l'EP	20mg/j soit 2 comprimés à 5 mg <u>2 fois/jour</u> pendant 7 jours Puis 10mg/j soit 1 comprimé à 5 mg <u>2 fois/jour</u>
Prévention de la récurrence de TVP et d'EP chez l'adulte	5 mg/j soit 1 comprimé à 2,5 mg <u>2 fois/jour</u>

Principaux effets indésirables et suivi de traitement

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
Saignement	Prévenir le patient de saignements même mineur : -saignement de nez ou gencives -hématomes -présence de sang dans les urines -présence de sang dans les selles ou selles noires et malodorantes -vomissements ou crachats sanglants -saignements qui ne s'arrêtent pas Dire au patient d'appeler le médecin en cas de saignements
Saignement interne	Les signes pouvant évoquer : -pâleur -fatigue ou essoufflement inhabituels -maux de tête persistants -malaise inexplicé Contacter le médecin
Nausées	Boire entre les repas, faire plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, fris, épicés. Manger lentement.

Interactions médicamenteuses

Eliquis® interagit avec **le CYP3A4 et de la P-gp** : kétoconazole, itraconazole, voriconazole et posaconazole, ritonavir, phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital ou millepertuis.

Intéactions également avec les autres **anti-coagulants, antiagrégants plaquettaires et AINS** (dont l'acide acétylsalicylique).

Ne pas prescrire un autre anticoagulant avec Eliquis®.


Liste non exhaustive. Pour voir la liste complète, regarder le Vidal.


Grossesse


Il est déconseillé d'utiliser Eliquis® lors de la grossesse ou de l'allaitement.


Proposer un autre choix d'anticoagulant, comme certains AVK.


Conseils à donner aux patients

 Les comprimés ELIQUIS® doivent être avalées entières avec un verre d'eau pendant ou en dehors du repas. Si nécessaire, ils **peuvent être écrasés** (et mis dans de l'eau ou du dextrose à 5% ou du jus de pomme voir compote)

 En raison de son métabolisme, ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes (ex : millepertuis). Le patient doit préciser à son médecin, la liste de ces médicaments avec ou sans ordonnance.

 Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien.

 Conseiller de porter la carte « Je suis sous anticoagulant » que vous lui fournissez

 **En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose oubliée.** Puis poursuivre le **traitement normalement.**

 **Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.**

 **Contactez rapidement le médecin prescripteur en cas de :**

- Signes hémorragiques

Les contre-indications de ELIQUIS

- × saignement important,
- × maladie ou situation exposant à un risque hémorragique grave (ulcère de l'estomac ou du duodénum en cours ou récent, lésion intracrânienne récente par exemple)
- × maladie du foie associée à un trouble de la coagulation,
- × en association avec un autre anticoagulant