



Fluindione

PREVISCAN®

FICHE
CONSEIL
Professionnel

Présentation et caractéristiques

PREVISCAN est un **anticoagulant oral**, qui appartient à la famille **des AVK-** antivitamines K et un antithrombotique. Il empêche la formation de caillots. L'effet anticoagulant se manifeste après plusieurs jours de traitement et, de même, persiste plusieurs jours après l'arrêt.

Dosage	Présentation
Previscan® 20 mg	Comprimé quadrisécable rose. Boîte de 30

- Contrôle en routine indispensable : l'**INR** ou International Normalized Ratio. L'INR idéal est de 2,5 ; un INR inférieur à 2 reflète une anticoagulation insuffisante ; un INR supérieur à 3 traduit un excès d'anticoagulation. **Un INR supérieur à 5 est associé à un risque hémorragique**
- Si hémorragie grave : arrêt des AVK, et il est recommandé d'administrer en urgence un CCP (concentrés de complexes prothrombiniques) en association à de la vitamine K

Indications

Renouvellement d'un traitement équilibré par fluindione dans les indications suivantes :

- **Cardiopathies emboligènes** : prévention des complications thromboemboliques en rapport avec certains troubles du rythme auriculaire (fibrillations auriculaires, flutter, tachycardie atriale), certaines valvulopathies mitrales, les prothèses valvulaires.
- **Prévention des complications thromboemboliques des infarctus du myocarde compliqués** : thrombus mural, dysfonction ventriculaire gauche sévère, dyskinésie emboligène...
- **Traitement des thromboses veineuses profondes et de l'embolie pulmonaire** ainsi que la prévention de leurs récurrences.

Posologie et mode d'administration

Adulte	<p>En raison d'une importante variabilité interindividuelle, la posologie d'AVK est strictement individuelle. La dose d'équilibre doit être recherchée et maintenue. Elle est habituellement de 20 mg, à adapter en fonction des résultats biologiques</p> <p>Administré en une prise par jour. Il est préférable que la prise ait lieu le soir, afin de pouvoir modifier la posologie dès que possible après les résultats de l'INR.</p>
Sujet âgé	La dose moyenne d'équilibre est plus faible chez le sujet âgé que chez le sujet jeune, habituellement $\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ de la dose
Population pédiatrique	L'expérience des anticoagulants oraux chez l'enfant demeure limitée. La surveillance du traitement relève d'un service spécialisé. Les AVK sont à éviter autant que possible chez les nourrissons de moins de 1 mois. Consulter le Vidal



Principaux effets indésirables

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
Saignement	Prévenir le patient de saignements même mineur : -saignement de nez ou gencives -hématomes -présence de sang dans les urines -présence de sang dans les selles ou selles noires et malodorantes -vomissements ou crachats sanglants -saignements qui ne s'arrêtent pas Dire au patient d'appeler le médecin en cas de saignements
Saignement interne	Les signes pouvant évoquer : -pâleur -fatigue ou essoufflement inhabituels -maux de tête persistants -malaise inexplicé Contacter le médecin
Diarrhées	Boire entre les repas, faire plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, fris, épicés. Manger lentement.

Interactions médicamenteuses

Previscan® interagit avec **les autres anti-coagulants, AINS et antiagrégants plaquettaires.**

Il est contre-indiqué de prendre Previscan avec du millepertuis, du miconazole, du phénylbutazone, mais aussi certaines formes d'acide acétylsalicylique

Liste non exhaustive. Pour voir la liste complète, regarder le Vidal

Grossesse

Il est contre-indiqué de prendre Previscan® pendant la grossesse ou l'allaitement

Conseils à donner aux patients

- ⚠ Porter une carte mentionnant votre traitement anticoagulant. Surveiller étroitement le risque de saignement. Remplissez régulièrement votre carnet
- ⚠ Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Le patient doit préciser à son médecin, la liste de ces médicaments avec ou sans ordonnance
- ⚠ Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien
- ⚠ Si oubli d'une prise, la dose oubliée peut être prise jusqu'à 8 après l'heure habituelle. Ne pas doubler la dose. Noter tout oubli dans votre carnet de suivi
- ⚠ Contacter rapidement le médecin en cas de :
 - Signes hémorragiques

Contre-indications

- Hypersensibilité à la fluindione ou à l'un des excipients
- Insuffisance hépatique sévère.
- En cas d'association avec les médicaments suivants :*
 - l'acide acétylsalicylique : pour des doses anti-inflammatoires d'acide acétylsalicylique (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) ; pour des doses antalgiques ou antipyrétiques (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère gastroduodéal ;
 - le miconazole utilisé par voie générale ou en gel buccal ;
 - les AINS pyrazolés : la phénylbutazone
- En cas d'association avec le millepertuis
- En cas de grossesse, excepté chez les femmes enceintes portant une valve cardiaque mécanique, qui présentent un risque élevé de thromboembolie
- En cas d'allaitement.
- Chez les patients présentant une allergie au blé (autre que la maladie cœliaque).