


Ce médicament peut **interagir avec de nombreuses autres molécules**. Il est contre-indiqué de prendre Previscan avec du millepertuis, du miconazole, du phénylbutazone, mais aussi certaines formes d'acide acétylsalicylique

N'oubliez pas de **donner la liste complète des médicaments**, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien



Version juin 2020

Fluindione

PREVISCAN®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un **anticoagulant oral**. Il est utilisé pour fluidifier le sang pour éviter la formation de caillots, ou les dissoudre.

Dosage	Présentation
Previscan® 20 mg	Comprimé quadrisécable rose. Boîte de 30

Suivi du traitement par Previscan

Il faut réaliser des prises de sang régulières dans un même laboratoire pour mesurer l'**INR** :

- l'INR doit être compris entre 2 valeurs cibles, fixées par votre médecin
- vous devez récupérer vos résultats d'INR le jour-même
- si l'INR sort de ces valeurs : contactez votre médecin
- toujours faire ces mesures **dans le même laboratoire**

Il est nécessaire de tenir un carnet de suivi : demandez le à votre pharmacien ou médecin

Posologie Conseils de prise

Fluindione
PREVISCAN®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



Une prise quotidienne, le soir, toujours à la même heure, pendant ou en dehors des repas, sans oublier.

Il est fortement recommandé de prendre Previscan le soir en cas d'adaptation posologique faite par le médecin, après avoir obtenu vos résultats INR l'après-midi

Bien respecter la dose prescrite par votre médecin.

Avaler les comprimés avec un verre d'eau



Conservez hors de portée des enfants.

Signalez que vous prenez un traitement Previscan à tout professionnel de santé

A conserver au maximum 2 ans, à une température inférieure à 25°C

Quelques conseils



Porter une carte mentionnant votre traitement anticoagulant
Surveiller étroitement **le risque de saignement**
Remplissez régulièrement **vos carnets**



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien



Ayez une alimentation **équilibrée et variée**. L'alcool peut modifier l'effet anti-coagulant du médicament. Le jeûne augmente l'effet anti-coagulant.






N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez oublié de prendre Previscan :
→ La prise est possible dans les 8 heures après l'heure habituelle
→ Passé ce délai, ne pas rattraper la dose oubliée.
→ NE PAS doubler la dose
→ Noter tout oubli dans votre carnet de suivi



Il est contre-indiqué de prendre Previscan® pendant la grossesse ou l'allaitement. Parlez-en à votre médecin : il existe d'autres types d'anticoagulants qui peuvent être pris lors de la grossesse

	Saignements	Apparition de saignements même mineur : -saignement de nez ou gencives -hématomes -présence de sang dans les urines -présence de sang dans les selles ou selles noires et malodorantes -vomissements ou crachats sanglants -saignements qui ne s'arrêtent pas
 	Saignement Interne non visible	Les signes pouvant évoquer : -pâleur -fatigue ou essoufflement inhabituels -maux de tête persistants -malaise inexplicable

Si des saignements apparaissent, prévenez directement votre médecin.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;



Consultez immédiatement votre médecin ou appelez le SAMU en composant le 15 en cas :

- de saignement
- d'hémorragie sévère, dans ce cas arrêtez toute prise de PREVISCAN