


Ne pas oublier de **donner la liste complète des médicaments**, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne pas prendre de nouveaux médicaments sans en informer votre médecin ou votre pharmacien.



Version Juin 2020

Turoctocog alfa (facteur VIII)

NOVOEIGHT®


À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament **analogue du facteur VIII** de la coagulation. Il est utilisé dans **le traitement et la prévention des saignements** chez les patients atteints **d'hémophilie A**.

Ce médicament doit être initialement prescrit par un médecin hospitalier. Sa délivrance est réservée aux pharmacies hospitalières.

Dosages	Présentations
NOVOEIGHT® 250 UI	Chaque boîte contient: - 1 flacon de poudre, - 4 mL de solvant dans une seringue pré-remplie, - l'ensemble du matériel nécessaire à la reconstitution et à la réalisation d'une injection.
NOVOEIGHT® 500 UI	
NOVOEIGHT® 1000 UI	
NOVOEIGHT® 1500 UI	
NOVOEIGHT® 2000 UI	
NOVOEIGHT® 3000 UI	

Posologie Conseils de prise



Plan de prise

Bien respecter la dose prescrite par votre médecin.

Après chaque injection, noter dans le carnet d'hémophile :

- La date** de l'injection
- Le nom et numéro de lot du produit** (utiliser les étiquettes décollables présentes sur le carton/flacon)
- Le nombre d'UI injectées, le motif de l'injection.**

A conserver hors de portée des enfants.



Avant reconstitution

- à conserver au réfrigérateur
 - Conserver le flacon sans l'emballage extérieur d'origine
 - Éviter de le mettre dans la porte du réfrigérateur
- A température ambiante < 30°C
 - Jusqu'à 9mois
 - Ne pas remettre le produit au réfrigérateur
 - Nb : conservation entre 30-40°C pendant 3 mois

- Après reconstitution
→ utiliser immédiatement

Turoctocog alfa NOVOEIGHT®

Quelques conseils



Toute décision de modification de dose ou d'arrêt du médicament doit être prise par le médecin du CRTH. Ne jamais prendre l'initiative seul.



En cas de voyage, partir avec :

- la carte d'hémophile
- le carnet de santé
- la carte de groupe sanguin
- l'ordonnance
- le carnet d'hémophile
- un certificat médical
- un courrier du médecin faisant référence au traitement par NOVOEIGHT®



Ne pas utiliser NOVOEIGHT® en cas d'antécédent de réaction allergique à ce médicament, ainsi qu'au hamster.



Ne jamais arrêter votre traitement ni modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Le facteur VIII ne doit être administré qu'en cas de nécessité absolue au cours de la grossesse et de l'allaitement.



Ne pas jeter les flacons vides et le matériel dans votre poubelle, mais plutôt dans les boîtes jaunes DASRI. Les rapporter avec les boîtes vides ensuite à votre pharmacien.

Principaux effets indésirables

	Développement d'anticorps neutralisants le médicament	Des tests spécifiques seront réalisés pour détecter la présence éventuelle de ces inhibiteurs.
	Hypersensibilité, réaction allergique	En cas de difficulté à respirer, de fortes démangeaisons, ou urticaire contacter le médecin.
	Rougeurs, phlébite superficielle, hémorragie musculaire,	En cas d'apparition de ces symptômes, contacter le médecin.
	Toux	Si ce symptôme persiste, prévenir le médecin.
	Fièvre, rougeur au niveau du site d'injection	Prendre des antidouleurs si nécessaire.
	Vomissements	Continuer à bien s'hydrater. En cas de vomissements importants, prévenir le médecin.

Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**;



Consultez immédiatement votre médecin ou appeler le SAMU en composant le 15 en cas :

- De difficulté à respirer
- De fortes démangeaisons
- De difficultés à arrêter un saignement