


Ne pas oublier de **donner la liste complète des médicaments**, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Ne pas prendre de nouveaux médicaments sans en informer votre médecin ou votre pharmacien.



Version Juin 2020

Simoctocog alfa (facteur VIII)

NUWIQ®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament **analogue du facteur VIII** de la coagulation. Il est utilisé dans **le traitement et la prévention des saignements** chez les patients atteints **d'hémophilie A**.

Ce médicament doit être initialement prescrit par un médecin hospitalier. Sa délivrance est réservée aux pharmacies hospitalières.

Dosages	Présentations
NUWIQ® 250 UI	Chaque boîte contient : <ul style="list-style-type: none">- 1 flacon de poudre,- 2,5 mL de solvant dans une seringue pré-remplie,- l'ensemble du matériel nécessaire à la reconstitution et à la réalisation d'une injection.
NUWIQ® 500 UI	
NUWIQ® 1000 UI	
NUWIQ® 2000 UI	
NUWIQ® 2500 UI	
NUWIQ® 3000 UI,	
NUWIQ® 4000 UI	

Posologie Conseils de prise

Simoctocog alfa NUWIQ®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



Bien respecter la dose prescrite par votre médecin.

Après chaque injection, noter dans le carnet d'hémophile :

- La date de l'injection
- Le nom et numéro de lot du produit (utiliser les étiquettes décollables présentes sur le carton/flacon)
- Le nombre d'UI injectées, le motif de l'injection.

A conserver hors de portée des enfants.



Avant reconstitution

- à conserver au réfrigérateur
 - Conserver le flacon sans l'emballage extérieur d'origine
 - Éviter de le mettre dans la porte du réfrigérateur
- A température ambiante
 - Jusqu'à 1 mois
 - Ne pas remettre le produit au réfrigérateur

- Après reconstitution
→ utiliser immédiatement

Quelques conseils



Toute décision de modification de dose ou d'arrêt du médicament doit être prise par le médecin du CRTH. Ne jamais prendre l'initiative seul.



En cas de voyage, partir avec :

- la carte d'hémophile
- le carnet de santé
- la carte de groupe sanguin
- l'ordonnance
- le carnet d'hémophile
- un certificat médical
- un courrier du médecin faisant référence au traitement par NUWIQ®



Ne jamais arrêter votre traitement ni modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Ne pas utiliser NUWIQ® en cas d'antécédent de réaction allergique à ce médicament.



Le facteur VIII (NUWIQ®) ne doit être administré qu'en cas de nécessité absolue au cours de la grossesse et de l'allaitement.



Ne pas jeter les flacons vides et le matériel dans votre poubelle, mais plutôt dans les boîtes jaunes DASRI. Les rapporter avec les boîtes vides ensuite à votre pharmacien.

	Développement d'anticorps neutralisants le médicament	Des tests spécifiques seront réalisés pour détecter la présence éventuelle de ces inhibiteurs.
	Hypersensibilité, réaction allergique	En cas de difficulté à respirer, de démangeaisons, d'un urticaire ou contacter le médecin.
	Douleur, Fièvre	Prendre des antidouleurs si nécessaire.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;



Consultez immédiatement votre médecin ou appeler le SAMU en composant le 15 en cas :

- De difficulté à respirer
- De fortes démangeaisons, urticaire
- De difficultés à arrêter un saignement