

Ne pas oublier de **donner la liste complète des médicaments**, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



**Ne pas prendre de nouveaux médicaments sans en informer votre médecin ou votre pharmacien.**



## Moroctocog alfa (facteur VIII)


REFACTO®

### À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament **analogue du facteur VIII** de la coagulation. Il est utilisé dans le **traitement et la prévention des saignements** chez les patients atteints **d'hémophilie A**.

Ce médicament doit être initialement prescrit par un médecin hospitalier. Sa délivrance est réservée aux pharmacies hospitalières.

Dosages	Présentations
REFACTO® 250 UI	Chaque boîte contient : - 1 flacon de poudre, - 4 mL de solvant dans une seringue pré-remplie, - l'ensemble du matériel nécessaire à la reconstitution et à la réalisation d'une injection.
REFACTO® 500 UI	
REFACTO® 1000 UI	
REFACTO® 2000 UI	
REFACTO® 3000 UI	



# Posologie Conseils de prise

## Moroctocog alfa REFACTO®

# Principaux effets indésirables

### Plan de prise



**Bien respecter la dose prescrite** par votre médecin.

Après chaque injection, noter dans le carnet d'hémophile :

- La date de l'injection
- Le nom et numéro de lot du produit (utiliser les étiquettes décollables présentes sur le carton/flacon)
- Le nombre d'UI injectées, le motif de l'injection.

A conserver hors de portée des enfants.



#### Avant reconstitution

- à conserver au réfrigérateur
  - Conserver le flacon sans l'emballage extérieur d'origine
  - Éviter de le mettre dans la porte du réfrigérateur
- A température ambiante <25°C
  - Jusqu'à 3 mois
  - Ne pas remettre le produit au réfrigérateur

- Après reconstitution  
→ utiliser immédiatement

### Quelques conseils



Toute décision de modification de dose ou d'arrêt du médicament doit être prise par le médecin du CRTH. Ne jamais prendre l'initiative seul.



En cas de voyage, partir avec :

- la carte d'hémophile
- le carnet de santé
- la carte de groupe sanguin
- l'ordonnance
- le carnet d'hémophile
- un certificat médical
- un courrier du médecin faisant référence au traitement par REFACTO®



**Ne jamais arrêter votre traitement ni modifier le rythme d'administration** sans avis du médecin prescripteur.



Ne pas utiliser REFACTO® en cas d'antécédent de réaction allergique à ce médicament, ou au hamster.



Le facteur VIII (REFACTO®) ne doit être administré qu'en cas de nécessité absolue au cours de la grossesse et de l'allaitement.



Ne pas jeter les flacons vides et le matériel dans votre poubelle, mais plutôt dans les boîtes jaunes DASRI. Les rapporter avec les boîtes vides ensuite à votre pharmacien.

	Développement d'anticorps neutralisants le médicament	Des tests spécifiques seront réalisés pour détecter la présence éventuelle de ces inhibiteurs.
	Hypersensibilité, réaction allergique	En cas de difficulté à respirer, de fortes démangeaisons ou une éruption cutanée, contacter le médecin.
	Fièvre, douleur aux articulations, maux de tête	Prendre des antidouleurs si nécessaire.
	Toux	En cas de persistance de ce symptôme, prévenir le médecin.

Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**;



**Consultez immédiatement votre médecin ou appeler le SAMU en composant le 15** en cas :

- De difficulté à respirer
- De fortes démangeaisons
- De difficultés à arrêter un saignement