


ACCÈS DOULOUREUX PAROXYSTIQUES (ADP)

Définition :

Exacerbation transitoire d'une douleur cancéreuse existante déjà contrôlée par un traitement de fond adapté.

ADP



- **C'est une exacerbation transitoire :**

- Survenue rapide < 3 minutes (<10 minutes)
- Intensité modérée à sévère
- Courte durée ≈ 30 minutes (15 à 60 minutes)

ADP



- C'est une exacerbation transitoire,
- **Sur une douleur de fond contrôlée / stabilisée :**
 - EN < 4/10
 - 4 ADP maximum / jour
 - Sommeil préservé
 - Activités habituelles possibles
 - Peu ou pas d'effets secondaires
 - Traitement des Accès douloureux efficace > 50%

ADP

- C'est une exacerbation transitoire,
- Sur une douleur de fond contrôlée / stabilisée
- **Par un traitement de fond $\geq 60\text{mg EMO}$ depuis > 8 jours :**
 - 60 mg de morphine orale / jour
 - 25 μg fentanyl transdermique / 72h
 - 30 mg d'oxycodone / jour
 - 8 mg d'hydromorphone / jour


ADP

- Pourquoi traiter l'ADP par un Fentanyl transmuqueux ?



- Pour adapter la pharmacocinétique au caractère paroxystique de la douleur !
- Le Fentanyl transmuqueux est un Fentanyl d'action rapide (FAR)

Comment prendre le FAR selon l'ADP ?



Formes disponibles de FAR

Actiq®

▶ Comprimé avec applicateur buccal : 200, 400, 600, 800, 1200, 1600 µg. (bte 3 cp)

Abstral®

▶ Comprimé sublingual : 100, 200, 300, 400, 600, 800 µg. (bte 10 ou 30 cp)

Breakyl®

▶ Film orodispersible : 200, 400, 600, 800, 1200 µg. (bte 4, 10 ou 28 films)

Effentora®

▶ Comprimé gingival : 100, 200, 400, 600, 800 µg (bte 4 ou 28 cp)

Instanyl®

▶ Pulvérisation nasale : 50, 100, 200 µg. (Flacons unidoses (boîtes de 6) ou 10 doses)

PecFent®

▶ Pulvérisation nasale : 100 et 400 µg. (Flacons avec compteur 8 doses)

Recivit®

▶ Comprimé sublingual : 133, 267, 400, 533, 800 µg. (Bte 15 ou 30 cp)


Titration FAR : principe général

Selon accords professionnels



1^{er}

ADP



INSTANYL,
PECFENT

10-15 min

15-30 min

EFFENTORA , BREAKYL,
ABSTRAL, ACTIQ, RECIVIT

Nouvelle prise *

10-30 min

Interdose LI
de secours *



2^{ème}

ADP

Même dose si nouvel ADP
Délai mini 2 à 4h *


Même dose cumulée si nouvel ADP
Délai mini 2 à 4h *

Même dose cumulée si nouvel ADP
Délai mini 4h *

* Sauf si surdosage : somnolence, dyspnée

Maximum 4 doses par 24h


- **Ordonnance titration :**



- **INSTANYL** cinquante, cent et deux cents μg :

Une pulvérisation nasale (1x50) au premier d'accès douloureux
Si inefficace alors deux pulvérisations (2x50) au deuxième ADP
Si inefficace alors deux pulvérisations (2x100) au troisième ADP
Si inefficace alors deux pulvérisations (2x200) au quatrième ADP

Si efficace alors poursuivre au même dosage dès que ADP
Si inefficace alors renouveler la dose à 10-15 minutes (→)
Attendre 2 à 4h entre deux prises (1 à 2 doses par prise) de FAR
Nouvelle prise autorisée en l'absence de somnolence ou dyspnée
Ne pas dépasser quatre prises par jour au total



- **Ordonnance :**


- **PECFENT** cent microgrammes / quatre cents µg :

Une pulvérisation nasale (1x100) au premier d'accès douloureux
 Si inefficace alors deux pulvérisations (2x100) au deuxième ADP
 Si inefficace alors quatre pulvérisations (1x400) au troisième ADP
 Si inefficace alors deux pulvérisations (2x400) au quatrième ADP

Si efficace alors poursuivre au même dosage dès que ADP
 Si inefficace alors renouveler la dose à 10-15 minutes (→)
 Attendre 2 à 4h entre deux prises (1 à 2 doses par prise) de FAR
 Nouvelle prise autorisée en l'absence de somnolence ou dyspnée
 Ne pas dépasser quatre prises par jour au total

ACTIQ

200 / 400 / 600 / 800 / 1200 / 1600



• Ordonnance :

- **ACTIQ** deux cents, quatre cents, six cents, huit cents... µg :

Un bâtonnet à froter contre la joue (1x200) au premier ADP

Si inefficace alors un bâtonnet (1x400) au deuxième ADP

Si inefficace alors un bâtonnet (1x600) au troisième ADP

Si inefficace alors un bâtonnet (1x800) au quatrième ADP

Si inefficace alors un bâtonnet (1x1200) au cinquième ADP

Si inefficace alors un bâtonnet (1x1600) au sixième ADP

Si efficace alors poursuivre au même dosage dès que ADP


Si inefficace alors dose supplémentaire à 15-30 minutes (→)

Attendre 2 à 4h entre deux prises (1 à 2 doses par prise) de FAR

Nouvelle prise autorisée en l'absence de somnolence ou dyspnée

Ne pas dépasser quatre prises par jour au total

ABSTRAL
100 / 200 / 300 / 400 / 600 / 800



• **Ordonnance :**


- **ABSTRAL** cent, trois cents et quatre cents µg :

Un comprimé sublingual (1x100) au premier d'accès douloureux
Si inefficace alors deux comprimés (2x100) au deuxième ADP
Si inefficace alors un comprimé (1x300) au troisième ADP
Si inefficace alors un cp (1x400) au quatrième ADP
Si inefficace alors deux cp (2x300) au cinquième ADP
Si inefficace alors deux cp (2x400) au sixième ADP

Si efficace alors poursuivre au même dosage dès que ADP
Si inefficace alors dose supplémentaire à 15-30 minutes (→)
Attendre 2 à 4h entre deux prises (1 à 2 doses par prise) de FAR
Nouvelle prise autorisée en l'absence de somnolence ou dyspnée
Ne pas dépasser quatre prises par jour au total

BREAKYL

200 / 400 / 600 / 800 / 1200



- **Ordonnance titration :**

- **BREAKYL** deux cents, quatre cents, six cents... μg :

Un film orodispersible contre la joue (1x200) au premier ADP

Si inefficace alors un film (1x400) au deuxième ADP

Si inefficace alors un film (1x600) au troisième ADP

Si inefficace alors un film (1x800) au quatrième ADP

Si inefficace alors un film (1x1200) au cinquième ADP

Si efficace alors poursuivre au même dosage dès que ADP

Si inefficace alors dose supplémentaire à 15-30 minutes (→)


Attendre 2 à 4h entre deux prises (1 à 2 doses par prise) de FAR

Nouvelle prise autorisée en l'absence de somnolence ou dyspnée

Ne pas dépasser quatre prises par jour au total

EFFENTORA

100 / 200 / 400 / 600 / 800



- **Ordonnance titration :**

- **EFFENTORA** cent, deux cents, quatre cents, six cents... µg :

Un comprimé gengival (1x100) au premier ADP

Si inefficace alors un comprimé (1x200) au deuxième ADP

Si inefficace alors un comprimé (1x400) au troisième ADP

Si inefficace alors un cp (1x600) au quatrième ADP

Si inefficace alors un cp (1x800) au cinquième ADP

Si efficace alors poursuivre au même dosage dès que ADP

Si inefficace alors dose supplémentaire à 15-30 minutes (→)


Attendre 2 à 4h entre deux prises (1 à 2 doses par prise) de FAR

Nouvelle prise autorisée en l'absence de somnolence ou dyspnée

Ne pas dépasser quatre prises par jour au total

RECIVIT

133 / 267 / 400 / 533 / 800



• Ordonnance titration :

- **RECIVIT** cent trente trois et quatre cents μg :

Un comprimé sublingual (1x133) au premier d'accès douloureux

Si inefficace alors deux comprimés (2x133) au deuxième ADP

Si inefficace alors un comprimé (1x400) au troisième ADP

Si inefficace alors deux cp (1x400 + 1x133) au quatrième ADP

Si inefficace alors deux cp (2x400) au cinquième ADP

Si efficace alors poursuivre au même dosage dès que ADP

Si inefficace alors dose supplémentaire à 15-30 minutes (→)

Attendre 2 à 4h entre deux prises (1 à 2 doses par prise) de FAR

Nouvelle prise autorisée en l'absence de somnolence ou dyspnée

Ne pas dépasser quatre prises par jour au total

Remarques et conseils pratiques

- Il n'y a pas de supériorité d'un FAR sur un autre !
- Il est nécessaire de réaliser une titration en commençant par la plus faible dose de FAR disponible pour la galénique prescrite car il n'y a pas de corrélation entre la dose du FAR et la dose du traitement de fond.
- L'absence d'équivalence analgésique entre les différents FAR, impose de n'utiliser que le produit qui a déjà été titré.
- Certains FAR, comme l'Actiq, l'Effentora et le Recivit permettent une modulation de la dose absorbée, en arrêtant l'application ou en retirant le comprimé avant la fin de la dissolution.

Remarques et conseils pratiques

- Les solutions nasales (Instanyl et Pecfent) peuvent être préférées chez des patients ayant des mucites et lésions bucco-gengivales.
- L'utilisation des solutions nasales est déconseillée en cas de congestion nasale traitée par un vasoconstricteur local (risque de réduction de l'absorption) et contre-indiquée en cas d'obstruction sévère des voies aériennes, d'épistaxis chronique ou de radiothérapie de la face.
- L'Instanyl ne peut pas être administré chez un patient couché, contrairement au Pecfent.

Conditions de prescription

- Prescription de 28 jours
- Délivrance fractionnée de 7 jours
- Ordonnance sécurisée

- Délivrance fractionnée peut être annulée en précisant sur l'ordonnance : « à délivrer en une seule fois ».