


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de communiquer à votre médecin ou votre pharmacien la liste complète des médicaments que vous prenez, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes ou les produits naturels.



Si vous êtes sous AVK (Préviscan®, Coumadine®, sintron®) ou anticoagulants oraux (Xarelto®, Eliquis®..), veuillez en informer votre médecin et votre pharmacien, la vitamine E pourrait augmenter le risque de saignement.

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :

.....
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :

.....
.....
.....

Tél :

.....
.....

Vedrop 50 mg/ml solution buvable

TOCOFERSOLAN 50 mg/ml

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est le traitement de la carence en vitamine E due à une malabsorption digestive chez l'enfant atteint de cholestase chronique depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 18 ans.

La prescription est réservée aux spécialistes en hépato/gastro-entérologie ou en pédiatrie.

La délivrance se fera uniquement en pharmacie hospitalière.

Le médicament se présente sous forme d'une solution buvable (légèrement visqueuse, jaune pâle) administrable par voie orale avec ou sans eau.

Il se présente sous forme de flacon de 20 ml ou de 60 ml accompagné de seringue de 1 ml ou 2 ml afin de faciliter la mesure de la dose prescrite.

Posologie Conseils de prise

VEDROP 50 mg/ml solution buvable

Principaux effets indésirables

Plan de prise

La dose à administrer sera indiquée en ml par votre médecin sur l'ordonnance.

La posologie usuelle est de 0,34 ml/kg/j, Celle-ci sera ajustée en fonction du taux plasmatique de la vitamine E par votre médecin spécialiste.

Introduisez la **seringue de 1 ou 2 ml dans le flacon, tirez le piston de la seringue jusqu'à obtenir la dose exacte prescrite par le médecin**, videz la seringue directement dans la bouche ou dans un verre avec un peu d'eau. Veillez à bien refermer le flacon et à nettoyer la seringue après chaque utilisation.



Conservez le traitement à température ambiante. Après ouverture, le flacon devra être conservé au maximum 30 jours.



Conservez hors de la portée des enfants.

Quelques conseils



Ce médicament nécessite un suivi biologique rigoureux. **Le taux plasmatique de la vitamine E** doit être **surveillé chaque mois** pendant les premiers mois d'instauration du traitement puis de manière régulière.



Respecter les doses prescrites. Utilisez toujours la seringue fournie pour l'administration du médicament



Signaler la prise de ce traitement à l'ensemble des professionnels de santé.



N'arrêtez jamais brutalement votre traitement, la carence pourrait réapparaître.



Si vous avez pris plus de vitamine E que vous n'auriez dû, vous risquez d'avoir des effets indésirables tels que la diarrhée ou des douleurs abdominales. Informez en votre médecin



Si vous avez oublié de prendre votre médicament, ne pas doubler la dose pour compenser celle oubliée. Continuez votre schéma posologique habituel.

	Diarrhées	Ne mangez pas de légumes, ni de fruits ni de laitage. Préférez les féculents : riz, carottes cuites, pain blanc. Buvez abondamment de petites quantités d'eau. Si ces symptômes persistent pendant plus de deux jours, parlez en à votre médecin afin de réévaluer la posologie.
	Réactions cutanées (démangeaison, rougeurs.), perte de cheveux	Parlez en à votre médecin ou pharmacien
	Maux de tête, fatigue	Parlez en à votre médecin ou pharmacien
	Modification de la concentration sanguine en sodium et potassium Augmentation des transaminases	Ramenez tous vos résultats biologiques à votre médecin. Un bilan complet sera effectué tous les mois avec le dosage plasmatique de la vitamine E

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.