

ESKAZOLE ®

► Albendazole



Patient

À quoi sert ce médicament ?

- Eskazole ® est indiqué dans les deux indications :
- **Infection systémique** à Echinococcose à Echinococcus granulosus (hydatidose et kyste hydatique) ou à Echinococcus multilocularis (échinococcose alvéolaire) chez les enfants de plus de 3 ans.

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.



Flacon de 60 comprimés



- Conservation inférieure à 30°C



- **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?

- Patient de plus de 60kg : 1 comprimé deux fois par jour (toutes les 12 heures)
- Patient de moins de 60kg : 15mg/kg/j à répartir en 2 prises par jour sans dépasser 800mg par jour
- La durée de traitement dépend de l'indication, en général 28 jours de traitement puis une interruption de 14 jours entre chaque cure.

Comment ?

Administration par voie orale, comprimé à prendre au cours des repas avec un peu d'eau. Le comprimé peut être avalé, croqué ou écrasé.

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation

Des interactions avec d'autres médicaments peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables

Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription



- Grossesse et allaitement : administration du traitement contre-indiquée
- Homme et femme en âge de procréer n'utilisant pas de contraception : administration du traitement contre indiquée



Quels effets indésirables peuvent survenir avec ESKAZOLE® ?

Comme tous les médicaments, ESKAZOLE® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables les plus fréquents	Prévention
	Eruption cutanée, prurit et urticaire Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Appliquez des compresses froides sur les zones concernées (ne pas appliquer de lotions alcoolisées). Privilégiez les vêtements en coton amples et légers.
	Vertiges, céphalées Evitez la consommation d'excitants (café, alcool, tabac). En cas de vertiges, reposez-vous au calme et décomposez vos mouvements. Consultez votre médecin en cas de vertiges persistants, de maux de tête inhabituels, de bourdonnements d'oreille ou de vomissements. Pensez à bien vous hydrater.
	Elévation légère à modérée des enzymes hépatiques voire hépatite Pensez à pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.
	Douleurs abdominales, nausées, vomissements En cas de nausées/vomissements, fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. En cas de vomissements, utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits
	Alopécie réversible Utilisez un peigne à larges dents ou une brosse à poils naturels souples. Choisissez un shampoing doux, rincez vos cheveux à l'eau tiède et séchez-les à l'air libre ou à basse température. Evitez brushings, mises en plis, permanentes et colorations qui fragilisent vos cheveux.

 Seuls certains effets indésirables sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

- Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre **médecin** en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :

